E40	Oberai	2013						x				x		
E41	Paterson	2003					x				x			
E42	Peckham	2014							x	x				
E43	Rastogi	1999						x		x				
E44	Relton	2009					x				x			
E45	Relton	2012							x		x			
E46	Saha	2013						x				x		
E47	Sajedi	2008						x		x				
E48	Schreier	1997					x				x			
E49	Schwab	1990	x	x	x						x			
E50	Siebenwirth	2009						x		x				
E51	Sinha	2012							x			x		
E52	Steinsbekk	2005						x						x[2]
E53	Steinsbekk	2005					x							x[2]
E54	Straumsheim	2000			x			x		x				
E55	Thompson	2005						x			x			
E56	Thompson	2011					x				x			
E57	van Erp	1996					x							x[3]
E58	Walach	1997			x	x		x		x				
E59	Weatherley-Jones	2004						x		x				
E60	White	2003						x		x				
E61	Witt	2009					x							x[3]
E62	Yakir	2001						x			x			

Anmerkungen
[1] kein Peer-Review
[2] Prävention
[3] hohe Drop-out-Rate: E57 van Erp 1996: 26%, E61 Witt 2009: 53%

Tabelle 2 Beschreibung der aufgenommenen Studien

Nr.	Autorenschaft	Jahr	Diagnose	n ITT	n PP	Dauer	Experimentalgruppe	Kontrollgruppe
I1	Bonne	2003	Angststörung	44	39	10 Wochen	HOM	PLA
I2	Chapman	1999	Traumat. Gehirnverletzung	61	50	4 Monate	HOM	PLA
I3	Frass	2005	Sepsis	70	67	180 Tage	Standard + HOM	Standard + PLA
I4	Frei	2005	ADHS	62	57	180 Tage	HOM	PLA
I5	Jacobs	1993	akuter Durchfall Kindern	34	33	≤ 6 Tage	Standard + HOM	Standard + PLA
I6	Jacobs	1994	akuter Durchfall Kindern	92	81	≤ 5 Tage	Standard + HOM	Standard + PLA
I7	Jacobs	2000	akuter Durchfall Kindern	126	116	5 Tage	Standard + HOM	Standard + PLA
I8	Lökken	1995	Entfernung Weisheitszähne	24	24	5 Tage	HOM	PLA
I9	Whitmarsh	1997	Migräne	63	60	4 Monate	HOM	PLA

Anmerkungen
ITT=intention-to-treat Analyse; PP=per protocol Analyse; ADHS=Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom; HOM=Homöopathie; PLA=Placebo; Standard=Standardtherapie.